






아시아·태평양 경제협력체 기후센터

부산광역시 해운대구 센텀 7로 12

Tel: +82 51 745 3900 Fax: +82 51 745 3949, www.apcc21.org

2026년 8월 - 10월

- APCC ENSO 경보는 “엘니뇨 (El Nino)”를 제시함. 엘니뇨가 지속적으로 발달할 것으로 예상됨.
- 2026년 8월-2027년 1월 기간에는 남태평양 및 북대서양 일부를 제외한 전 지구 대부분 지역의 기온은 평년보다 높을 확률이 클 것으로 전망됨.
- 2026년 8월-10월에는 열대 중앙-동태평양 강수가 많을 것으로 전망되며, 중동아프리카, 인도양 서부, 인도, 인도네시아, 아적도 남태평양, 카리브해, 중앙 아메리카와 열대 대서양 지역 및 남미 북부의 강수는 평년보다 적을 것으로 전망됨. 2026년 11월 -2027년 1월에는 적도 태평양, 적도 인도양과 동아프리카, 동아시아, 멕시코만, 남미 남동부 지역의 강수가 많을 것으로 전망되며, 인도네시아 남부, 인도, 열대 북태평양, 남서태평양, 카리브해, 중앙 아메리카 및 남미 북부의 강수가 적을 것으로 전망됨.




2026년 8월 - 10월 기온(위)과 강수(아래)의 확률예측 및 과거 검증

2026년 11월 - 2027년 1월 정보는 <http://www.apcc21.org/prediction/global/outlook?lang=en> 에서 확인할 수 있습니다.

최근 기후 상태


- 2026년 6월에는 적도 태평양과 동인도양에서 양의 해수면온도 편차가 더욱 발달하였으며 아열대 북태평양 지역에서 양의 해수면 온도 편차도 지속적으로 유지됨.
- 지난 달에 비해 적도지역 중앙 및 동태평양에서 양의 해수면 온도 편차, 대류활동 및 서풍 편차가 함께 발달하여 엘니뇨 발달을 시사하고 있음.
- 러시아 중부, 유럽, 서아프리카와 남아프리카, 중앙 및 남아시아, 동남아시아, 캐나다 북부와 미국 서부, 남미 중동부 및 남극반도 지역의 기온이 높았으며 카스피해 부근과 몽골 동부, 남미 남동부와 남극지역의 기온이 평년보다 낮았음.
- 러시아, 북유럽, 서아프리카, 동남아시아 일부, 중국남부와 일본, 적도태평양, 미국 중부, 멕시코, 남미 북부 및 중부 일부 지역의 강수가 평년보다 많았으며, 서유럽, 중앙 및 동아프리카 일부, 남아시아와 동남아시아, 중국 동부, 인도네시아, 중미와 남미 북부 일부 지역의 강수가 평년보다 적었음.

Sea Surface Temperature



2026 6월 해수면 온도 분포(위) 및 평년대비 편차(아래) (평년: 1991-2020)

Sea Surface Temperature / Outgoing Longwave Radiation / U-wind at 850hPa




* Anomalies are averaged between 5°S and 5°N.

© APEC Climate Center


2024 7월 - 2026 6월 적도지역 해수면온도, 상향장파복사, 850hPa 동서 바람 평년대비 편차의 시간-경도 단면도 (평년: 1991- 2020)

최근 기후 상태

Temperature at 2m




Outgoing Longwave Radiation



2026 6월 기온 (위) 및 상향장파복사(아래)의 평년대비 편차 (평년 : 1991-2020)


2026년 8월 - 2027년 1월

- APCC ENSO 경보는 “엘니뇨(EI Nino)” 를 제시함.
- 2026년 8월-2027년 1월의 기간동안 적도 태평양 지역에서 양의 해수면 온도 편차가 강화되어 엘니뇨 발달을 시사함.
- 2026년 8월에 2.61°C로 예측되는 Niño3.4는 지속적으로 증가하여 2026년 12월에는 3.41°C에 다다를 것으로 예측됨.
- 예측 기간 내내 엘니뇨 발생 확률이 매우 높게(100%) 나타남.



2026년 8월 - 2027년 1월 ENSO 경보 (평년 : 1993-2016)
 * APCC ENSO 경보 정보는 2022년 4월부터 관측 자료 업데이트 상황에 따라 최신의 경보 정보를 제공하기 위하여 매월 15일, 말일경에 업데이트됨.
 엘니뇨/라니냐 발달에 대해 설정된 경보 기준에 따라 엘니뇨(라니냐) 주의/경계, 엘니뇨(라니냐), 엘니뇨/라니냐 비활성의 7가지로 정의하고 있으며 ENSO 경보는 다중모델앙상블 ENSO 예측과 다를 수 있음.


SST Anomaly for ASO-NDJ 2026




2026년 8월 - 2027년 1월 해수면온도 평년대비 편차 예측 (평년 : 1993-2016)

2026년 8월 - 2027년 1월

Nino3.4 Index for 2026 ASONDJ



Probabilistic ENSO Forecast for 2026 ASONDJ



* ENSO Intensity based on 3M Mean Nino3.4 SST Anomaly (Category Boundaries: $\pm 1.5, 1.0, 0.5^{\circ}\text{C}$)


2026년 8월 - 2027년 1월 평년대비 Nino3.4 지수 편차 예측 (위) 및 ENSO 종류와 강도 확률예측 (아래) (평년 : 1993-2016)

2026년 8월 - 10월

기온

- 북극해, 북동 대서양, 지중해와 서유럽, 아프리카 대륙 대부분, 인도양과 중동, 남아시아와 동남아시아, 중위도 북태평양, 열대 태평양, 카리브해와 중앙 아메리카, 아열대 북대서양, 남태평양 남동부와 남미 북부의 기온은 평년보다 높을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 북유럽 및 동유럽, 러시아, 그린란드, 동아시아, 북미, 남미 남부 지역의 기온은 평년보다 높을 확률이 다소 클 것으로 예상됨.
- 아열대 중앙 남태평양 지역의 기온은 평년보다 낮을 확률이 매우 클 것으로 전망되며 북대서양 일부지역의 기온은 기온이 낮을 확률이 다소 클 것으로 예상됨


Temperature at 2m for August-October 2026



강수

- 적도태평양과 아적도 북태평양, 남동 태평양, 남미 남동부지역의 강수는 평년보다 많을 확률이 매우 클 것으로 전망되며 동아프리카 끝단 및 적도 인도양 서부, 서아시아, 미국 서부, 남미 남부의 강수는 평년보다 많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨. 지중해, 북아프리카 및 남아프리카, 중앙아시아 및 러시아 중부 일부, 미국 중부 지역의 강수는 평년보다 많을 경향이 예상됨.
- 아라비아 반도 끝, 코랄해의 강수는 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨.
- 열대 남서태평양, 인도네시아와 열대 남동인도양, 열대 대서양 서부, 중미, 카리브해, 남미 북부 지역의 강수는 평년보다 적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 열대 대서양 동부, 중동 아프리카, 인도, 북서태평양, 호주 서부의 강수는 평년보다 적을 확률이 다소 클 것으로 예상됨. 중국 중부 지역의 강수는 평년보다 적을 경향이 전망됨.

Precipitation for August-October 2026



2026년 8월 - 10월 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 다중모델앙상을 확률예측 (평년 : 1993-2016)

기온		강수	
70% < 확률	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 경향이 전망됨
70% < 확률	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년과 비슷할 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년과 비슷할 경향이 전망됨
70% < 확률	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 경향이 전망됨


APCC 확률예측 서술 기준

2026년 11월 - 2027년 1월

기온

- 북극해, 북동대서양, 지중해와 서유럽, 대부분의 아프리카, 인도양, 아라비아반도 남부, 중국 동부, 남아시아와 동남아시아, 중위도 북서태평양, 열대태평양, 호주 동부, 캐나다 북부, 멕시코 남부, 카리브해, 중미 및 남미 중북부 지역의 기온은 평년보다 높을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 북유럽, 러시아, 호주 서부, 캐나다 서부 지역의 기온은 평년보다 높을 확률이 다소 클 것으로 예상됨.
- 북대서양, 및 아열대 남태평양의 일부지역, 멕시코 북부와 미국 남부, 남미 남부 일부지역의 기온은 평년보다 낮을 확률이 다소 클 것으로 전망됨.


Temperature at 2m for November 2026-January 2027



강수

- 적도 태평양, 적도 인도양, 동아프리카, 멕시코만과 아열대 북동대서양, 남미 남동부 지역의 강수는 평년보다 많을 확률이 매우 클 것으로 전망되며, 북극해, 아프리카 서부 및 중부, 중앙아시아와 동아시아, 멕시코와 미국 중부 및 남부, 남미 남부의 강수는 평년보다 많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨. 북유럽 및 동유럽, 러시아, 인도지역의 강수는 평년보다 많을 경향이 예상됨.
- 아프리카 북부 지역의 강수는 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨.
- 인도네시아와 뉴기니 남쪽지역, 열대 북서태평양, 아열대 남인도양 동부, 남서 태평양, 카리브해, wndal 및 남미 북부 지역의 강수는 평년보다 적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨. 지중해, 남아프리카, 캐나다 서부, 북대서양 북부의 강수는 평년보다 적을 확률이 다소 클 것으로 예상됨. 알래스카 지역의 강수는 평년보다 적을 경향이 전망됨.

Precipitation for November 2026-January 2027




2026년 11월 - 2027년 1월 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 다중모델앙상블 확률예측 (평년 : 1993-2016)

기온		강수	
70% < 확률	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 높을/많을 경향이 전망됨
70% < 확률	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년과 비슷할 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년과 비슷할 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년과 비슷할 경향이 전망됨
70% < 확률	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨	70% < 확률	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 매우 클 것으로 전망됨
50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 다소 클 것으로 전망됨	50% < 확률 < 70%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 확률이 다소 클 것으로 전망됨
40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 경향이 전망됨	40% < 확률 < 50%	기온/강수가 평년보다 낮을/적을 경향이 전망됨


APCC 확률예측 서술 기준

2026년 8월 - 10월


Temperature at 2m for August 2026




Precipitation for August 2026




Temperature at 2m for September 2026




Precipitation for September 2026



Temperature at 2m for October 2026




Precipitation for October 2026




2026년 8월 - 10월 월별 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 다중모델앙상블 확률예측 (평년: 1993-2016)

2026년 11월 - 2027년 1월


Temperature at 2m for November 2026




Precipitation for November 2026




Temperature at 2m for December 2026




Precipitation for December 2026



Temperature at 2m for January 2027



Precipitation for January 2027



2026년 11월 - 2027년 1월 월별 기온(위)과 강수(아래)의 평년대비 다중모델앙상블 확률예측 (평년 : 1993-2016)

- 최근 기후현황에 대한 자세한 정보는 <http://www.apcc21.org/monitoring/recent?lang=en> 에서 확인할 수 있습니다.
- 계절예측 및 검증에 대한 자세한 정보는 <http://www.apcc21.org/prediction/global/outlook?lang=en> 에서 확인할 수 있습니다.
- 본 기후전망은 매월 15일 경 아시아-태평양경제협력체 기후센터(APCC) 예측운영과에서 작성/배포합니다.
- 기후전망을 구독하고 싶으시거나 질문이 있으시면 mme@apcc21.org 로 연락주시기 바랍니다.
- APCC 기후전망은 전 세계 11개국 16개 기관으로부터 수집된 기후예측 모델 결과를 종합한 것으로 각국 기상청의 예보와 다를 수 있으니 참고자료로 활용해 주시기 바랍니다. 각 국가에 대한 공식 기후 전망은 각국 기상청의 발표를 참고해 주십시오.



감사의 글

아시아-태평양경제협력체 기후센터는 아태지역의 이상기후 감시 및 예측의 중추적 역할을 수행하기 위해 APEC 회원국 합의에 의해 2005년 부산에 설립되었습니다. 아시아-태평양경제협력체 기후센터는 전 세계 11개국 16개 기관의 기후예측 모델 자료를 수집하고, 모델 간 앙상을 기법을 통해 계통적 오차를 보정하여 고품질 기후정보를 제공하고 있습니다. 참여 기관으로는 호주 기상청(BOM), 캐나다 환경기후변화부(ECCC), 중국 기상청(BCC), 대만 기상청(CWA), 프랑스 기상청(METFR), 유럽-지중해 기후변화센터(CMCC), 일본 기상청(JMA), 아시아-태평양경제협력체 기후센터(APCC), 한국 기상청(KMA), 한국 국립농업과학원(NAS), 국립부경대학교(PKNU), 러시아 기상청(HMC), 러시아 중앙지구물리연구소(MGO), 영국 기상청(UK01), 미국 항공우주국(NASA), 미국 기상청(NCEP)이 있습니다.